

# BabySemp 1 BabySemp 1 Lemolac BabySemp 1 Lemolac SensiPro

Sustituto de la leche materna desde el nacimiento

## PREPARACIÓN



1 Siempre lávese las manos antes de preparar BabySemp 1/ BabySemp 1 Lemolac/ BabySemp 1 Lemolac SensiPro



2 Asegúrese de que la tetina, el biberón y el cazo estén limpios.



3 Ponga a hervir el agua. Deje enfriar a temperatura adecuada para comer.



4 Ponga el agua en el biberón.



5 Introduzca las medidas rasas de la fórmula en el biberón.



6 Cierre el biberón y agite hasta que se haya disuelto la fórmula.



7 Compruebe que la mezcla no esté demasiado caliente poniendo una gota en el interior de la muñeca. Pruébela siempre usted antes de dársela a su hijo.



8 BabySemp se debe dar recién hecho. No guarde el preparado sobrante.

8 ml = 4,3 g

## TABLA DE DOSIFICACIÓN

Agua	Polvo	Volumen preparado
60 ml	2 medidas	65 ml
90 ml	3 medidas	100 ml
120 ml	4 medidas	135 ml
150 ml	5 medidas	165 ml
180 ml	6 medidas	200 ml
210 ml	7 medidas	235 ml
240 ml	8 medidas	265 ml

**¡USE EL DOSIFICADOR ADJUNTO!**  
Es importante que emplee la cantidad justa de fórmula en relación con el volumen de agua. Una cantidad excesiva de fórmula puede provocar estreñimiento. Una cantidad insuficiente implica que su bebé no recibe la nutrición y la energía que necesita.

**¡Importante!** La leche materna es el mejor alimento para los niños.

## UTILIZACIÓN

Consulte siempre a Barnvårdscentralen sobre la alimentación de su bebé. BabySemp 1/Semp 1 Lemolac/ BabySemp 1 Lemolac SensiPro es un suplemento o sustituto de la leche materna, bajo prescripción de BVC o un pediatra y cubre las necesidades nutricionales de los niños hasta los 6 meses de edad. BabySemp 1 Lemolac/ SensiPro está acidulado, por lo que la proteína está parcialmente descompuesta y se vuelve más suave. Esto se aprecia al preparar BabySemp 1 Lemolac/ SensiPro, ya que el resultado es más parecido a los copos.

## ¡CONSEJO! CÓMO OBTENER RÁPIDAMENTE LA TEMPERATURA ADECUADA

1. Ponga agua fría a hervir.
2. Ponga la mitad del agua caliente en el biberón y rellene la otra mitad con agua previamente hervida y después enfriada a temperatura de nevera.
3. Cierre bien el biberón y agítelo hasta que se haya disuelto el polvo.
4. Compruebe que la mezcla no esté demasiado caliente poniendo una gota en el interior de la muñeca. Pruébela siempre usted antes de dársela a su hijo.



► **VEA EL VÍDEO DE PREPARACIÓN**



OMEGA 3 Y 6  
GOS  
NUCLEÓTIDOS



## INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ASESORADOS POR PEDIATRAS

Los niños pequeños pueden tener problemas para formar por sí mismos una cantidad suficiente de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga omega-3 (DHA) y omega-6 (ARA). Por eso se han incluido en BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac. BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac contiene también nucleótidos y GOS (galacto-oligosacáridos/fibras).

## TABLA DE PORCIONES

Edad del bebé	Cantidad por comida	Comidas al día	Cantidad* diaria
0-1 mes	80-150 ml	5-6	400-700 ml
1-2 meses	100-160 ml	5	600-800 ml
2-4 meses	140-200 ml	5	700-1000 ml
4-6 meses	140-250 ml	4-5	700-1200 ml

\*Las medidas indicadas en la tabla son aproximadas, porque no todos los niños comen lo mismo. Al igual que los niños que se alimentan con leche materna, los bebés que se alimentan con un sustituto deben controlar la cantidad y la frecuencia con la que desean alimentarse. Los niños suelen regular sus tomas en función de sus necesidades. Por ello, esta tabla es únicamente una guía.



## FECHA DE CONSUMO PREFERENTE

Ver la parte superior de la caja. Las cajas abiertas se deben consumir en el plazo máximo de un mes.

## ALMACENAMIENTO

Guárdelo en un lugar seco protegido de la luz y a temperatura ambiente. Siempre guarde la fórmula en su caja original.

## ¿QUIERE ENVIARNOS SUS CONSULTAS O COMENTARIOS?

No dude en contactar con nosotros  
Semper AB, konsumentkontakt@semper.se

**Tel. 020-62 20 00**

www.semperbarnmat.se

**Semper**  
NUTRITION