

BabySemp 2

BabySemp 2 Lemolac

Complément alimentaire à partir de 6 mois

PRÉPARATION







-  Au micro-ondes : versez la quantité exacte d'eau froide dans le biberon et ajoutez le nombre exact de dosettes rases de poudre.
 -  Refermez le biberon et agitez-le jusqu'à ce que la poudre soit dissoute.
 -  Réchauffez sans couvercle ni tétine, à pleine puissance, pendant environ 40 secondes.
 -  Vérifiez que le mélange n'est pas trop chaud avant de le donner à votre enfant.
 -  Servez BabySemp rapidement après préparation. S'il en reste, ne le gardez pas.
-  Dans une casserole : délayez la quantité exacte de poudre dans de l'eau froide dans une casserole et réchauffez jusqu'à la température de consommation.

TABLEAU DE DOSAGE

Eau	Poudre	Quantité obtenue
60 ml	2 dosettes	65 ml
90 ml	3 dosettes	100 ml
120 ml	4 dosettes	135 ml
150 ml	5 dosettes	165 ml
180 ml	6 dosettes	200 ml
210 ml	7 dosettes	235 ml
240 ml	8 dosettes	265 ml



UTILISEZ LA DOSETTE FOURNIE !
Il est important que la quantité de poudre soit correcte pour la quantité d'eau. Trop de poudre peut constiper votre enfant. Si vous ne mettez pas assez de poudre, votre enfant ne recevra pas assez d'énergie et de nutriments.

QUELLE QUANTITÉ LUI DONNER ?

Âge de l'enfant	Nombre de repas par 24 h	Eau	Poudre	Quantité obtenue
6 à 8 mois	1 à 3	210 ml	7 dosettes	235 ml
	1 à 4	180 ml	6 dosettes	200 ml
Plus de 8 mois	1 à 3	210 ml	7 dosettes	235 ml
	1 à 3	180 ml	6 dosettes	200 ml

Les besoins de nourriture varient d'un enfant à un autre. Et les quantités de compléments alimentaires nécessaires varient aussi. C'est pourquoi ce tableau n'est qu'une indication.

UTILISATION

Consultez toujours les services de protection de l'enfance au sujet de l'alimentation de votre enfant. Le lait BabySemp 2/BabySemp 2 Lemolac ne s'utilise que comme complément à l'alimentation de plus en plus variée de l'enfant. BabySemp 2/BabySemp 2 Lemolac ne convient qu'à partir de six mois. BabySemp 2/BabySemp 2 Lemolac ne doit pas être utilisé comme substitut de lait maternel pour les enfants de moins de six mois. Le lait BabySemp 2 Lemolac est acidifié, ce qui permet de fractionner partiellement la protéine et de l'adoucir. Cela se voit, car le BabySemp 2 Lemolac est mousseux une fois préparé.



À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT LE

Voit le dessus du paquet. Après ouverture, le délai d'utilisation est de 30 jours.

CONSERVER

Au sec, à l'ombre et à température égale ou inférieure à la température ambiante.

UNE QUESTION, UN AVIS ?

N'hésitez pas à nous appeler!
Semper AB, konsumentkontakt@semper.se

Tel. 020-62 20 00

www.semperbarnmat.se

► **REGARDEZ NOTRE VIDÉO POUR LA PRÉPARATION !**



OMÉGA 6
GOS
FER
VITAMINE D
IODE



RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN CONCERTATION AVEC DES PÉDIATRES
BabySemp 2/BabySemp 2 Lemolac contient un mélange soigneusement sélectionné de graisse de lait et d'huiles végétales que nous appelons Lipilact. Ce mélange contient des acides gras polyinsaturés à longue chaîne ainsi que plusieurs substances présentes dans les membranes des globules gras du lait (MFGM), par exemple les phospholipides, les gangliosides et les glycoprotéines. Les nourrissons peuvent avoir du mal à produire par eux-mêmes des quantités suffisantes d'acide gras polyinsaturé à longue chaîne, l'oméga-6 (acide arachidonique AA). C'est pourquoi le BabySemp 2/BabySemp 2 Lemolac en contient. Le fer contribue à un développement intellectuel satisfaisant et à la compréhension de l'enfant. La vitamine D est nécessaire pour une croissance et un développement normaux de l'ossature, et l'iode contribue à une croissance normale. C'est pourquoi le BabySemp 2/BabySemp 2 Lemolac est enrichi de fer, de vitamine D et d'iode, ainsi que de GOS (galactooligosaccharides/fibres).

Semper
NUTRITION